



Avertissements[®]

agricoles Auvergne & Limousin

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

n° 4

Le 16 Mars 1988

C O L Z A : Charançon de la tige
Intervenir.

CEREALES : Attention aux maladies
cette année.

COLZA

Stades (Entre-nœuds visibles - C2)
(Tige 3 à 5 cm de hauteur)
(Boutons accolés cachés - D1)
(Localement)

CHARANÇON DE LA TIGE

☆ Situation

L'activité est faible actuellement.

☆ Préconisation

déjà fait.

Intervenir d'urgence en tous secteurs si cela n'a pas été

stade tige 20 cm de hauteur.

Le colza est sensible aux attaques de charançons jusqu'au

MALADIES

☆ Situation

. Cylindrosporiose : absente

. Pseudocercospora : symptômes rares dans le secteur
d'ESTIVAREILLES (03).

☆ Préconisation :

Aucun traitement fongicide ne se justifie actuellement.

RACCOURCISSEURS SUR COLZA

Le Service de la Protection des Végétaux a conduit sur
2 ans 7 essais pour juger de l'intérêt de divers raccourcisseurs sur colza.

Dans l'état actuel de nos connaissances, nous sommes assez
réservés quant à l'intérêt de ces produits.

P.1.6

- Si l'on raccourcit les plantes, on peut aussi souvent avoir un effet dépressif au rendement.

- On observe une tendance à augmenter le nombre de siliques mais aussi une diminution du nombre de grains par silique.

- L'effet raccourcisseur est très net à la floraison, puis il s'estompe à la récolte.

BLE

Stades (Fin tallage - 4
)Redressement - 5
(Epi à 10 cm - 51 (Localement)

MALADIES

☆ Situation

L'hiver 87 - 88 a été très favorable aux maladies (Janvier et Février exceptionnellement doux).

La Rouille brune est déjà observée sur variétés sensibles en de nombreuses situations et en semis de fin octobre.

Le Piétin-verse est déjà signalé dans l'ALLIER.

La Septoriose (tritici) est fortement présente en LIMOUSIN et dans l'ALLIER.

L'Oïdium se manifeste sur semis précoces.

☆ Préconisation

1988 risque d'être une année à maladies. Il faudra être particulièrement vigilant pour la Rouille brune mais aussi pour la Rouille jaune.

Le traitement "montaison" sera à effectuer plus tôt cette année.

PROTECTION DES VEGETAUX ET TELEMATIQUE

Vous voulez connaître la situation phytosanitaire dans votre secteur - instantanément 24 h/24 - savoir s'il faut intervenir ? C'est désormais possible : par une consultation rapide (messages brefs - actualisés) - sans contrainte d'abonnement (TELETEL 3) à faible coût (prix communication) en utilisant votre MINITEL.

*Tél. 36.15

*Code : AVERT

*Taper 1

BETTERAVE SUCRIERE

INSECTICIDES DU SOL

- Critères du choix

PRODUITS DOSE/HA	E F F I C A C I T E						SELECTIVITE
	NEMATODE	TAUPIN	BLANIULE SCUTIGERELLE	TIPULE	ATOMAIRE	PUCERON JAUNISSE	
TEMIK 18 kg	X	X	XX	XXX	X	XXX	XXX
DACAMOX 15kg		X	XX	X	X	XXX	XX
COUNTER PLUS 10 kg		XXX	XXX	XX	XXX	X	XX
CURATER 12kg DELEX		XX	XXX	XXX	XXX	XX	XX
DELTANET 12kg		XX	XXX	XXX	XXX	X	XX
ONCOL 12 kg		XX	XX	XX	XXX	X	XX
MARSHAL FORT 7,5 kg		XXX	●	XX	XXX	X	XXX

Légende :

"EFFICACITE" :

☒ XXX très bonne
☒ XX bonne
☒ X moyenne
☐ Insuffisante
☒ ● produit nouveau ; références insuffisantes

"SELECTIVITE" :

☒ XXX très bonne
☒ XX satisfaisante

"SOURCE" :

ITB + essais S.P.V.

En cas de risque nématodes, préférer TEMIK, mais ce produit étant insuffisant sur taupins, il est recommandé de le compléter par une pulvérisation de lindane à 900 g de matière active par ha avec incorporation avant le semis.

Il en est de même pour DACAMOX.

Pour un risque important d'atomaires, aucun insecticide du sol n'assure une protection suffisante, un traitement en végétation devra être effectué si nécessaire.

KREGAN et LORSBAN en plein ont une efficacité correcte mais inférieure aux insecticides microgranulés.

P O I S

Le dépliant joint est à conserver.

P7